

ศหนองฝีเป็นหนองอย่างไร... 1. ทุกรูปแบบ

ฝีฝีชาย จะมีอาการปัสสาวะ
แสบขี้ด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ
หากไม่ได้รับการรักษาเชื้อจะลุกลาม
ลงไปถึงถุงอัณฑะ ทำให้เกิดอัณฑะ
อักเสบอาจทำให้บวมฝีฝีได้

ฝีฝีหญิง ฝีฝีฝีฝีไม่มีอาการ
ถ้ามีอาการจะมีตกขาวมากผิดปกติ
บางครั้งมีหนองปน ปัสสาวะแสบขี้ด
ปวดท้องน้อย บางรายอาจมีฝีฝี
บริเวณอวัยวะเพศ ถ้าไม่ได้
รับการรักษาอาจบวมฝีฝีได้



สอวพ.

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.aidsthai.org





สอวพ.

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.aidsthai.org



เลือกวิธีป้องกัน... กับตัวท่าน...ให้เหมาะสม

1. การปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัย (safe sex)

ได้แก่

- ♀ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
- ♀ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการสอดใส่
- ♀ การร่วมเพศระหว่างคู่นอนที่ไม่มีเชื้อทั้งคู่น

2. ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง
ที่มีเพศสัมพันธ์

3. รักษาความสะอาดของร่างกายและ
อวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ



4

ถุงยางอนามัย... ทางปลอดภัย... ของวัยรุ่น



เลือกถุงยาง.....

ถ้ารักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้ผลดีที่สุดขนาดถุงยางอนามัย ถ้าหวั่นกลัวว่าอายุยังไม่
ประชาชนทั่วไปใช้วัดขนาดอวัยวะเพศ เพื่อจะได้เลือกขนาด
ของถุงยางอนามัยให้เหมาะสมกับอวัยวะเพศของตนเอง
ปัจจุบันถุงยางอนามัยที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข
จะมี 2 ขนาด คือ ขนาด 49 มม. กับ ขนาด 52 มม.



ใช้ถูกวิธี.....

♥ ล้างมือ ระวังอย่าให้
เชื้อแบคทีเรียถุงยาง
มีเชื้อหรืออาจรั่วหรือ
แตกได้

♥ บีบปลายถุงยางอนามัย
ไล่อากาศใส่เสมอ
จากปลายให้มียาอากาศ
ที่ปลายถุงยาง อาจจะทำให้
ถุงยางแตกได้

♥ สวมถุงยางขณะอวัยวะเพศ
แข็งตัว บีบปลายถุงยาง
ขณะสวม แล้วรัดขอบถุงยาง
ให้สุดโคน

♥ เมื่อเสร็จกิจรีบถอด
อวัยวะเพศออกขณะแข็งตัว
เพื่อป้องกันถุงยางหลุด
ภายในช่องคลอด

♥ ใช้กระดาษทิชชูหุ้มรอบ
ถุงยางเพื่อไม่ให้มีสัมผัส
กับถุงยาง แล้วรัดขอบถุงยาง
ออกจากอวัยวะเพศ
หรือใช้วิธีสอดเข้าใน
ขอบถุงยาง โดยระวัง
ไม่ให้มีสัมผัสด้านนอก
ของถุงยางแล้วรัดออก

♥ ทิ้งในถังขยะหรือภาชนะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด





สอวพ.

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.aidsthai.org

เมื่อมีปัญห... จะปรึกษา..ใครดีหน...

การปฏิบัติตัวขณะป่วยและรักษา

1. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
2. ควรงดดื่มเหล้า-เบียร์และของมีแอลกอฮอล์
3. ควรพักผ่อนไปตรวจโดยเร็วที่สุด
4. รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
5. ไม่ควรซื้อยารักษาตนเอง เพราะอาจทำให้เชื้อดื้อยา รักษาไม่หาย บดบังอาการ
6. ไปรับการตรวจตามนัดทุกครั้งและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
7. ผู้ชายไม่ควรฉีดอวัยวะเพศเพื่อดูหอง จะทำให้อักเสบมากยิ่งขึ้น

เชิญปรึกษาและรับการตรวจได้ที่.....

- ♥ คลินิกวัยรุ่น_บางรัก กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0 2286 0431 0 2286 0108 ต่อ 32 หรือ www.stithai.org
วันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น.
- ♥ สถานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

